



INFORME COORDINACIÓN EVAU FÍSICA 2018-19

incluye RESULTADOS del pasado CURSO 2017-18

y contiene enlace a ejemplos de cuestiones de Gauss y capacidad y condensadores

Esta versión del informe sustituye a la que aparecía en la web de la UCLM hasta la semana de las reuniones de coordinación del curso 2018-19 celebradas entre el 5 y el 9 de noviembre de 2018

(documento actualizado a fecha 21-noviembre-2018)

Antonio J. Barbero García
antonio.barbero@uclm.es

José Carlos Mena Arroyo
jocman007@gmail.com



Índice

Informe resultados EVAU 2017-18 → páginas 3-7

Formato de examen para el curso 2018-19 → pág 8

Catálogo de prácticas de laboratorio (cuestión experimental) → pág 9

P1 Péndulo simple → pág 10 P2 Ley de la refracción → pág 13

P3 Ángulo límite → pág 16 P4 Inducción electromagnética → pág 19

ANEXO
(enlaces)

Formato examen EVAU (desde curso 2016-17 en adelante) → pág 26

Modelos de problemas de ondas (interferencias, intensidad, potencia) y óptica geométrica (lentes) → pág 26

Modelos de cuestiones teorema de Gauss, capacidad y condensadores → pág 26

Matriz de especificaciones Física 2º Bachillerato → pág 26

Informe resultados de cursos anteriores → pág 26

Exámenes resueltos de años anteriores → pág 27

Enunciados adicionales de años anteriores → pág 27

Nuevo en
curso 2018-19

➔ FECHAS DE EXAMEN **EVAU UCLM** - CURSO ACADÉMICO 2018-19

Convocatoria ordinaria

Exámenes 3, 4 y 5 de junio 2019

Convocatoria extraordinaria

Exámenes 1, 2 y 3 de julio 2019

NOTA SOBRE CONTENIDOS OFICIALES DE EXAMEN **EVAU UCLM** - CURSO ACADÉMICO 2018-19

A fecha 29-09-2018 aún no se ha publicado la norma técnica (la ECD/42/2018, de 25 de enero que utilizamos el 2017/2018 tenía vigencia para sólo para ese curso), pero todo indica que no deben esperarse cambios en los contenidos para el curso presente 2018-19. Si aparece cualquier novedad en este sentido, se difundirá para general conocimiento.

DATOS ESTADÍSTICOS OFICIALES UCLM – JUNIO/JULIO 2018
(En el resumen de resultados siguiente **no** están incluidos los centros especiales)

Ordinaria

Extraordinaria


ASIGNATURA: FÍSICA jun-18						ASIGNATURA: FÍSICA jul-18					
MATRICULADOS: 1729						MATRICULADOS: 251					
Campus	Aprobados	%	Suspensos	%	Nota media	Campus	Aprobados	%	Suspensos	%	Nota media
Albacete	215	58,9%	150	41,1%	5,35	Albacete	21	37,5%	35	62,5%	4,04
Ciudad Real	298	61,8%	184	38,2%	5,38	Ciudad Real	32	43,8%	41	56,2%	4,34
Cuenca	132	66,7%	66	33,3%	5,53	Cuenca	14	50,0%	14	50,0%	4,90
Toledo	445	65,2%	238	34,8%	5,47	Toledo	53	56,4%	41	43,6%	5,06
SUBTOTAL:	1090	63,1%	638	36,9%	5,42	SUBTOTAL:	120	47,8%	131	52,2%	4,61
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II jun-18						ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II jul-18					
MATRICULADOS: 4359						MATRICULADOS: 789					
Campus	Aprobados	%	Suspensos	%	Nota media	Campus	Aprobados	%	Suspensos	%	Nota media
Albacete	744	72,3%	285	27,7%	5,99	Albacete	42	21,6%	152	78,4%	3,10
Ciudad Real	858	67,9%	405	32,1%	5,74	Ciudad Real	66	29,5%	158	70,5%	3,64
Cuenca	387	76,6%	118	23,4%	6,09	Cuenca	36	40,9%	52	59,1%	4,14
Toledo	1123	71,9%	439	28,1%	5,92	Toledo	75	26,5%	208	73,5%	3,48
SUBTOTAL:	3112	71,4%	1247	28,6%	5,91	SUBTOTAL:	219	27,8%	570	72,2%	3,51
ASIGNATURA: QUÍMICA jun-18						ASIGNATURA: QUÍMICA jul-18					
MATRICULADOS: 3120						MATRICULADOS: 534					
Campus	Aprobados	%	Suspensos	%	Nota media	Campus	Aprobados	%	Suspensos	%	Nota media
Albacete	629	84,7%	114	15,3%	7,21	Albacete	60	45,1%	73	54,9%	4,71
Ciudad Real	740	82,8%	154	17,2%	7,03	Ciudad Real	80	53,7%	69	46,3%	4,83
Cuenca	318	83,9%	61	16,1%	7,08	Cuenca	29	46,8%	33	53,2%	4,67
Toledo	897	83,2%	181	16,8%	7,15	Toledo	62	33,7%	122	66,3%	3,91
SUBTOTAL:	2584	83,5%	510	16,5%	7,12	SUBTOTAL:	231	43,8%	297	56,3%	4,44

Datos estadísticos oficiales UCLM para pruebas de acceso a la universidad



<https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/orientadores/estadisticaspruebasacceso>

COMPARATIVA CON AÑOS ACADÉMICOS ANTERIORES. ASIGNATURA: FÍSICA


Matriculados
 Junio (blue)
 Sept (orange)
 Julio (yellow)



	MATRICULADOS		NOTA MEDIA		% APROBADOS	
	JUNIO	SEPT	JUNIO	SEPT	JUNIO	SEPT
2010	1542	248	5,06	3,65	55%	27%
2011	1607	248	5,82	4,01	68%	37%
2012	1525	209	5,51	3,33	60%	22%
2013	1527	212	6,47	3,00	74%	17%
2014	1600	197	5,41	3,28	60%	25%
2015	1542	195	6,33	3,93	73%	37%
2016	1577	175	5,75	2,94	66%	22%
2017	1668	159	6,08	3,60	69%	25%
2018	1729	251	5,42	4,61	66%	48%



Informe resultados EVAU 2017-18
 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS GLOBAL JUNIO 2018
 (DATOS DE CORRECTORES, 1ª CORRECCIÓN)



Distribución aprobados		
	General A+B	
>=5	1071	62%
>=6	787	46%
>=7	544	31%
>=8	334	19%
>=9	131	8%

Distribución suspensos		
	General A+B	
0-1]	65	4%
0-2]	167	10%
0-3]	296	17%
0-4]	478	28%
0-5]	644	38%

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DESAGREGADO POR OPCIONES JUNIO 2018
(DATOS DE CORRECTORES, 1ª CORRECCIÓN)


INTERVALO: 0.25 puntos. TAMAÑO MUESTRA: 1715

DISTRIBUCIÓN APROBADOS

	OPCIÓN A		OPCIÓN B	
>=5	781	66%	290	55%
>=6	584	49%	203	39%
>=7	412	35%	132	25%
>=8	259	22%	75	14%
>=9	98	8%	33	6%

DISTRIBUCIÓN SUSPENSOS

	OPCIÓN A		OPCIÓN B	
0-1]	47	4%	18	3%
0-2]	114	10%	53	10%
0-3]	202	17%	94	18%
0-4]	311	26%	167	32%
0-5]	407	34%	237	45%




	Núm.	Nota media
Alumnos que eligen opción A	1188	69% 5,56
Alumnos que eligen opción B	527	31% 5,10

Media ponderada = 5.42

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PORCENTUALES JUNIO 2018
(DATOS DE CORRECTORES, 1ª CORRECCIÓN)

DESAGREGADO POR OPCIONES Y AGRUPADO POR NOTAS (PUNTOS ENTEROS)
INTERVALO: 1 punto. TAMAÑO MUESTRA: 1715



Cada barra vertical indica el **porcentaje** de alumnos de cada opción que obtuvieron una nota comprendida entre los puntos enteros $N-1$ y N , incluyendo $N-1$ y excluido N . Por ejemplo, las barras correspondientes a $6 <$ se refieren a los que obtuvieron las notas 5,00, 5,25, 5,50 y 5,75. Caso especial: las dos barras situadas más a la derecha incluyen las notas 9,00, 9,25, 9,50, 9,75 y 10. Las cifras situadas junto a las barras expresan el **número absoluto** de alumnos que obtuvo nota comprendida dentro del intervalo correspondiente.

Formato de examen para el curso 2018-19

Se preparan 4 modelos de examen, cada uno contiene dos opciones.

En cada opción:

- 2 problemas (3 puntos cada uno)
- 3 cuestiones (1 punto cada una)
- 1 cuestión experimental (1 punto)

TIPOLOGÍA PROBLEMAS

Ondas (formato seno) → 4

Ecuación de onda armónica: 2

(velocidad, energía, potencia, intensidad)

Interferencia ondas armónicas: 1

Óptica lentes: 1 (lentes delgadas, los espejos quedan para cuestiones)

Gravitación → 4

Satélites en órbita: 2

Caída libre campo gravitatorio: 2

(velocidades, fuerza centrípeta, energía)

Campo eléctrico → 4

Cargas puntuales: 2

(campo, potencial, energía)

Equilibrio electrostático: 1

(igualdad potenciales, reparto cargas)

Equilibrio mecánico: 1

(fuerzas equilibradas)

Magnetismo e inducción EM → 4

Movimiento cargas campo B: 2

(trayectorias, fuerza centrípeta)

Fuerza magnética entre conductores: 1

Inducción electromagnética: 1

TIPOLOGÍA CUESTIONES

Ondas

Sonido

Óptica

Campo gravitatorio

Campo eléctrico

Campo magnético

Inducción

Física Nuclear

Física Cuántica

La Física del siglo XX

Observación:
El teorema de Gauss y capacidad y condensadores pueden proponerse en formato de cuestión (preguntas de 1 punto), pero no se incluirán en la parte de problemas.

TIPOLOGÍA CUESTIONES EXPERIMENTALES

Práctica péndulo simple

Práctica ley de refracción

Práctica ángulo límite

Práctica inducción electromagnética

(guiones de prácticas en páginas siguientes)



PRÁCTICAS DE FÍSICA EVAU CURSO ACADÉMICO 2018-19

Antonio J. Barbero García, José Carlos Mena Arroyo,
Senén Martínez Maraña, Alicia Díaz Marcos y Fernando Cirujano Gutiérrez

PRÁCTICA 1. PÉNDULO SIMPLE.

Una determinación aproximada de la aceleración de la gravedad

Objetivo:


Determinación del valor de la aceleración de la gravedad.

Fundamento:

Un péndulo simple es una masa puntual suspendida de un hilo inextensible de longitud L que oscila en torno a la vertical con un periodo dado por la fórmula:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

En esta fórmula T designa al periodo y g es la aceleración de la gravedad.



Materiales:


1. Péndulo simple constituido por un hilo inextensible y una pesa o bolita de pequeñas dimensiones (masa puntual). Montaje sobre un soporte desde el cual se sujeta el hilo del que colgamos la masa puntual.
2. Cronómetro y cinta métrica.

PRÁCTICA 1. PÉNDULO SIMPLE.

Una determinación aproximada de la aceleración de la gravedad

Procedimiento

1. Colgar una longitud de hilo de algo más de un metro, medir dicha longitud (L) con la cinta métrica, desde el punto de suspensión hasta el centro de la masa (esto deberá apreciarse por inspección visual). Después separar el péndulo de la vertical y liberarlo. Observaremos sus oscilaciones para asegurarnos de que tienen lugar en un plano (es decir, que no describe una trayectoria cónica) y cuando estemos seguros de esto, hay que emplear el cronómetro para medir el tiempo t_1 invertido en describir $N = 10$ oscilaciones (una oscilación completa es el movimiento de vaivén desde un extremo hasta regresar al mismo). Observación: la amplitud A de la oscilación no debe exceder de 10° con el fin de que la fórmula teórica del periodo que vamos a usar nos de una aproximación adecuada.
2. Repetir otras cuatro veces más la medida del tiempo empleado en las N oscilaciones con la misma cautela indicada antes respecto a la oscilación en un mismo plano, y así obtendremos un total de cinco valores de t_1, t_2, t_3, t_4, t_5 invertido en $N = 10$ oscilaciones.
3. [Optativo. Repetir el procedimiento entero utilizando un péndulo que tenga distinta longitud].
4. [Optativo. Repetir el procedimiento entero utilizando un péndulo que tenga distinta masa].



Observación. Si se desea puede medirse un número N de oscilaciones diferente, pero en tal caso se recomienda que sea un número como 5, 8, 16 o 20, para que al dividir más adelante para obtener los periodos de oscilación no aparezcan números inexactos en los resultados.

PRÁCTICA 1. PÉNDULO SIMPLE.

Una determinación aproximada de la aceleración de la gravedad

Tratamiento de datos:


1. Confeccionar una tabla con las medidas tiempos t de N oscilaciones, donde anotaremos todos los cálculos indicados a continuación.
2. Calcular para cada valor del tiempo t el correspondiente periodo del péndulo $T \rightarrow T = t / N$
3. Calcular para cada valor del tiempo un valor de la aceleración de la gravedad

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \rightarrow g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$$

Obtendremos así cinco valores que llevamos a la tabla g_1, g_2, g_3, g_4, g_5

4. Determinar el valor promedio de la aceleración de la gravedad

$$g = \frac{1}{5}(g_1 + g_2 + g_3 + g_4 + g_5)$$



Cuestiones

1. ¿Depende el periodo de la masa del péndulo?.
2. ¿Cómo varía el periodo del péndulo si se emplea un hilo más corto o más largo para el péndulo? ¿Varía entonces el valor de g ?
3. ¿Qué longitud debería tener el péndulo para que el periodo fuese el doble del que hemos medido?
4. ¿Qué longitud debería tener el péndulo para que el periodo fuese de 1 s?
5. Si se hiciese esta experiencia en la Luna, donde la gravedad es 6 veces menor que en la Tierra, ¿cuál sería el periodo de un péndulo que en la Tierra tuviese un periodo de 1 s?

	Longitud del péndulo L (m) =			
	Número N de oscilaciones	Tiempo t de N oscilaciones (s)	Periodo (s) $T = t/N$	Cálculo g ($\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$)
1				
2				
3				
4				
5				

PRÁCTICA 2. LEY DE LA REFRACCIÓN.

Medida del índice de refracción de una lámina de vidrio

Objetivo:

Determinar el índice de refracción de un vidrio.

Fundamento:




La ley de la refracción, ley de Snell o ley de Descartes establece que cuando la luz atraviesa una interfase (superficie de separación) entre dos medios con distintos índices de refracción, la relación entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción está dada por:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

El índice de refracción de un medio es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en dicho medio.

Materiales:

1. Para fuente luminosa: banco óptico, fuente de luz, diafragma, lente y fuente de alimentación de los equipos de óptica. (Todo este equipamiento puede sustituirse por un puntero láser, debidamente supervisado por el profesor. **PRECAUCIÓN: nunca mirar de frente el haz láser, nunca debe apuntarse el puntero láser al ojo**).
2. Para medidas: hemicilindro de vidrio y disco soporte graduado en ángulos (disco de Hartl).






PRÁCTICA 2. LEY DE LA REFRACCIÓN.

Medida del índice de refracción de una lámina de vidrio

Procedimiento

1. Colocar el hemcilindro sobre el disco soporte graduado, con su cara plana alineada con un diámetro del disco, y colocado de manera que el centro de la cara plana coincida con el centro del disco.
2. Dirigir el haz luminoso hacia el centro de la cara plana del hemcilindro de modo que incida perpendicularmente sobre ella y verificar que la luz transmitida sale por el punto opuesto de la cara curva del hemcilindro. La perpendicular a la cara plana es la normal.
3. Girar ligeramente el disco soporte, de modo que la luz incidente forme un ángulo i con la normal (se recomienda un ángulo de 10°). Observar la salida de la luz refractada y determinar cuál es el ángulo r que corresponde. Anotar estos valores.
4. Repetir lo indicado en el paso anterior para 5 distintos valores del ángulo de incidencia, incrementando de 10° en 10° . Anotar los valores correspondientes.

Observación: puesto que la cara curva del hemcilindro es circular, la luz que incide sobre el centro de la cara plana y se refracta dentro del vidrio viajará en la dirección del radio cuando está dentro del hemcilindro, y por eso no se desviará cuando emerja a través de la cara curva.



PRÁCTICA 2. LEY DE LA REFRACCIÓN.

Medida del índice de refracción de una lámina de vidrio

Tratamiento de datos:

1. Confeccionar una tabla con las medidas de ángulos de incidencia i y refracción r .
2. Calcular los senos de los ángulos de incidencia i y refracción r .
3. Como el rayo incidente proviene del aire, el índice de refracción del primer medio es $n_1 = 1$. Completamos la tabla siguiente después de determinar los valores del índice de refracción n_2 aplicando




$$n_2 = \frac{\sin i}{\sin r}$$

$i(^{\circ})$	$r(^{\circ})$	$\sin i$	$\sin r$	$n_2 = \frac{\sin i}{\sin r}$

4. Obtener la media aritmética de los índices de refracción. Aceptaremos este valor medio como índice de refracción del vidrio.

Cuestiones

1. ¿Qué rayo está más próximo a la normal, el incidente o el refractado?
2. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta anterior si la luz pasara del vidrio al aire en lugar de pasar del aire al vidrio?
3. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vidrio?



PRÁCTICA 3. ÁNGULO LÍMITE. Ángulo límite en una lámina de vidrio

Objetivos:

1. Observación del ángulo límite cuando la luz pasa de un medio ópticamente más denso a otro menos denso.
2. Utilizar las observaciones del ángulo límite para estimar el índice de refracción.



Fundamento:

La ley de la refracción predice que al pasar de un medio de índice de refracción más grande a otro más pequeño, la luz se aleja de la normal, pues el seno del ángulo de refracción será mayor que el seno del ángulo de incidencia $\sin r = \frac{n_1}{n_2} \sin i$. Puesto que el seno de cualquier ángulo tiene un valor máximo de 1, esto significa que existe un ángulo de incidencia, llamado ángulo límite, a partir del cual deja de existir rayo refractado: la luz se refleja íntegramente en la interfase y vuelve al medio de procedencia (medio 1), sin que haya luz refractada en medio 2.


$$\text{Condición de ángulo límite } \sin i_L = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Materiales (mismo equipamiento que para práctica 2):

1. Para fuente luminosa: banco óptico, fuente de luz, diafragma, lente y fuente de alimentación de los equipos de óptica. (Todo este equipamiento puede sustituirse por un puntero láser, debidamente supervisado por el profesor. **PRECAUCIÓN: nunca mirar de frente el haz láser, nunca debe apuntarse el puntero láser al ojo**).
2. Para medidas: hemcilindro de vidrio y disco soporte graduado en ángulos (disco de Hartl).



A diferencia de la práctica 2, ahora el haz luminoso se hará entrar través de la cara curva.



PRÁCTICA 3. ÁNGULO LÍMITE. Ángulo límite en una lámina de vidrio

Procedimiento

1. Colocar el hemcilindro sobre el disco soporte graduado, con su cara plana alineada con un diámetro del disco, y colocado de manera que el centro de la cara plana coincida con el centro del disco.
2. Dirigir el haz luminoso apuntado hacia el centro del disco, pero entrando en la lámina por la cara curva (figura A). Mediante el giro del disco soporte iremos incrementando el ángulo de incidencia (figuras B, C), hasta que lleguemos a observar la desaparición del rayo refractado (figura D).
3. Una vez alcanzado un ángulo de incidencia en el que ya ha desaparecido el rayo refractado (es decir, cuando ya se produce reflexión total, figura D), volvemos atrás girando en sentido inverso para medir el ángulo de incidencia al que corresponde un rayo refractado rasante sobre la cara plana (figura C): tal ángulo de incidencia será el ángulo límite para la interfase aire-vidrio.
4. Repetir el procedimiento indicado en los puntos 2 y 3 un total de 4 veces para reunir 4 medidas del ángulo límite.





Figura A




Figura B




Figura C




Figura D

PRÁCTICA 3. ÁNGULO LÍMITE. Ángulo límite en una lámina de vidrio

Tratamiento de datos:

1. Rellenar la tabla siguiente con los valores de ángulo límite obtenidos y calcular para cada uno de ellos el valor del índice de refracción aplicando la condición de ángulo límite (el medio 2 es el aire).

Medida	Áng límite i_L (°)	$\sin(i_L)$	n_1 (vidrio)
1			
2			
3			
4			

2. Calcular el promedio de los valores del índice de refracción obtenidos.

Cuestiones

1. ¿Podría darse el fenómeno de la reflexión total si desde el borde de una piscina apuntamos el haz de una linterna hacia la superficie el agua? A la inversa: ¿podría darse el fenómeno de reflexión total si un buzo sumergido apuntase el haz de una linterna hacia la superficie del agua?
2. ¿Cuál es la velocidad de la luz dentro del vidrio que hemos utilizado?
3. Suponiendo que repetimos esta experiencia con un vidrio cuyo índice de refracción sea el doble, ¿su ángulo límite sería mayor o menor?






Figura C



PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

A. Observación de la fuerza electromotriz inducida por la variación de flujo magnético

Objetivo:

Observación de la presencia de fuerza electromotriz en un circuito que sufre variaciones del flujo magnético y su relación con la ley de Faraday.

Fundamento:

Ley de Faraday: la variación con el tiempo del flujo magnético a través de cualquier superficie produce en el contorno de la misma una fuerza electromotriz inducida (*fem*) proporcional a la variación de flujo, y de manera que la *fem* inducida se opone a la variación de flujo que la produce.

$$\varepsilon = fem = -\frac{d\phi}{dt}$$

La fuerza electromotriz inducida es cualquier causa capaz de mantener una intensidad de corriente circulando en un circuito eléctrico o bien capaz mantener una diferencia de potencial distinta de cero entre dos puntos de un circuito abierto.

Materiales:

1. Bobina de al menos 500 espiras.
2. Imán permanente.
3. Voltímetro y cables de conexión (también puede usarse un amperímetro lo bastante sensible)




Figura A




Figura B




Figura C

PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

A. Observación de la fuerza electromotriz inducida por la variación de flujo magnético

Descripción preliminar

1. Una forma sencilla de procurar que el flujo magnético varíe y visualizar el fenómeno de inducción es utilizar una espira conductora simple a través de la cual se hace moverse a un imán permanente. Si el imán se aproxima a la bobina, el incremento de flujo magnético crea un campo eléctrico inducido en la espira que mueve las cargas libres de la misma, generando una corriente inducida i que recorrerá la espira dando origen a su vez a un campo magnético inducido cuyas líneas se enfrentan a las líneas de campo del imán permanente (figura A).
2. Una forma alternativa de ver lo anterior es considerar la espira como un imán virtual que enfrenta su polo del mismo nombre al polo del imán real que se está acercando (figura B).

Procedimiento

1. Para realizar observaciones útiles necesitamos usar una bobina de al menos 500 espiras, de modo que efectos de todas ellas se sumen y el efecto sea apreciable (figura C).
2. Conectar la bobina a los dos bornes del aparato de medida (voltímetro o amperímetro) y observar que en ausencia de imán la lectura del aparato es cero.
3. Colocar el imán en reposo dentro del hueco de la bobina y observar cuál es ahora la lectura del aparato.
4. Mover el imán alternativamente hacia fuera y hacia dentro del hueco de la bobina y observar las lecturas del aparato (hacia donde se desvía la aguja si el aparato es analógico o el signo de la lectura si el aparato es digital).
5. Repetir la experiencia de movimiento del imán pero con más rapidez que antes. Observar nuevamente las lecturas.




Figura A




Figura B




Figura C

PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

A. Observación de la fuerza electromotriz inducida por la variación de flujo magnético

Observaciones:

Rellenar la tabla siguiente recogiendo las observaciones realizadas (figura C).

	Situación	Lectura del aparato
1	Sin imán	
2	Imán en reposo dentro bobina	
3	Imán en movimiento (despacio)	
4	Imán en movimiento (deprisa)	




Figura A




Figura B

Cuestiones

1. Explicar la causa de las diferencias entre las lecturas de la situación 2 y las situaciones 3 y 4.
2. ¿Existe diferencia cualitativa o cuantitativa entre las lecturas de las situaciones 3 y 4? En caso afirmativo, ¿cómo podrían explicarse?
3. ¿Cómo sería el esquema correspondiente a la figura B si el imán de la derecha, en lugar de acercarse, se estuviese alejando de la espira?
4. ¿Cómo sería el esquema correspondiente a la figura B si el imán de la derecha, en lugar de aproximarse con su polo norte encarado a la espira, se estuviese acercando pero encarando su polo sur?




Figura C

PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.


B. Aplicación de la inducción electromagnética: el alternador.

Objetivo:

Describir el fundamento del alternador.

Fundamento:

El alternador es un dispositivo en el que el giro de una parte móvil viene asociado con una variación de flujo magnético, lo cual, de acuerdo con la ley de Faraday, da lugar a fuerza electromotriz inducida que se usa para generar una corriente (variable) que puede ser utilizada con fines prácticos. El ejemplo más simple es el de una espira plana que gira en un campo magnético uniforme (esquema a la derecha), de modo que el cambio en la orientación de la superficie a medida que la espira va girando produce un cambio de flujo magnético. Este cambio da lugar a la aparición de *fem* inducida entre los dos terminales de la espira.




El flujo magnético ϕ cambia a medida que cambia el ángulo θ .

$$\phi = B \cdot S \cdot \cos \theta$$


$$\varepsilon = fem = -\frac{d\phi}{dt}$$

Materiales:

1. Panel de montaje con inducido de espiras que giran mediante una manivela.
2. Imán permanente.
3. Voltímetro y cables de conexión (también puede usarse un amperímetro lo bastante sensible) para experiencia 4B.1.
4. Lámpara con su soporte y cables de conexión para experiencia 4B.2.



Experiencia 4B.1



Experiencia 4B.2

PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

B. Aplicación de la inducción electromagnética: el alternador.


Procedimiento experiencia 4B.1

1. Colocar el imán en su lugar sobre el panel de montaje y conectar el panel con el aparato de medida (voltímetro o amperímetro)
2. Girar lentamente la manivela, procurando hacerlo con un ritmo uniforme. Observar el aparato de medida. Después mover la manivela en sentido contrario.
3. Girar más rápidamente la manivela, también con un ritmo uniforme. Observar el aparato de medida. Después mover la manivela en sentido contrario.

Observaciones:

Rellenar la tabla siguiente recogiendo las observaciones realizadas (experiencia 4B.1).


Situación	Observaciones sobre la lectura del aparato
1 Giro lento en un sentido	
Giro lento sentido contrario	
2 Giro rápido en un sentido	
Giro rápido sentido contrario	



El flujo magnético ϕ cambia a medida que cambia el ángulo θ .

$$\phi = B \cdot S \cdot \cos \theta$$

$$\varepsilon = fem = -\frac{d\phi}{dt}$$



Experiencia 4B.1



Experiencia 4B.2

PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

B. Aplicación de la inducción electromagnética: el alternador.


Procedimiento experiencia 4B.2

1. Colocar el imán en su lugar sobre el panel de montaje y conectar el panel con la lámpara.
2. Girar lentamente la manivela, procurando hacerlo con un ritmo uniforme. Observar la lámpara. Después mover la manivela en sentido contrario.
3. Girar más rápidamente la manivela, también con un ritmo uniforme. Observar la lámpara. Después mover la manivela en sentido contrario.

Observaciones:

Rellenar la tabla siguiente recogiendo las observaciones realizadas (experiencia 4B.2).


Situación	Observaciones sobre el efecto en la lámpara
1 Giro lento en un sentido	
Giro lento sentido contrario	
2 Giro rápido en un sentido	
Giro rápido sentido contrario	




El flujo magnético ϕ cambia a medida que cambia el ángulo θ .

$$\phi = B \cdot S \cdot \cos \theta$$

$$\varepsilon = fem = -\frac{d\phi}{dt}$$



Experiencia 4B.1




Experiencia 4B.2

PRÁCTICA 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

B. Aplicación de la inducción electromagnética: el alternador.

Cuestiones


1. ¿Hay lectura distinta de cero en la experiencia 4B.1 al mover lentamente la manivela? ¿Brilla la lámpara cuando se mueve lentamente la manivela en la experiencia 4B.2?
2. ¿Existe diferencia cualitativa o cuantitativa en las respuestas a la pregunta anterior cuando la manivela se mueve en sentido opuesto?
3. ¿Qué explicación puede darse a estos hechos experimentales (experiencias 4B.1 y 4B.2)?
4. ¿Hay lectura distinta de cero en la experiencia 4B.1 al mover rápidamente la manivela? ¿Brilla la lámpara cuando se mueve rápidamente la manivela en la experiencia 4B.2?
5. ¿Existe diferencia cualitativa o cuantitativa en las respuestas a la pregunta anterior cuando la manivela se mueve en sentido opuesto?
6. ¿Qué explicación puede darse a estos hechos experimentales cuando giramos la manivela con rapidez (experiencias 4B.1 y 4B.2)?
7. Explica brevemente por qué la corriente producida por un alternador no circula siempre en el mismo sentido.
8. Analiza desde el punto de vista dimensional la ley de Faraday. ¿Cuáles son las unidades S.I. del flujo magnético?



El flujo magnético ϕ cambia a medida que cambia el ángulo θ .

$$\phi = B \cdot S \cdot \cos \theta$$

$$\varepsilon = fem = -\frac{d\phi}{dt}$$



Experiencia 4B.1



Experiencia 4B.2

ANEXO

Para descargar los archivos copiar los enlaces indicados en la barra del navegador.

Formato de examen EVAU (vigente desde curso 2016-17)

<https://drive.google.com/open?id=11mbLzPPqgyADzIzRe6IP6AHYSBt2dPDB>

Modelos de problemas de ondas (interferencias) y óptica geométrica (lentes)

<https://drive.google.com/open?id=1ezQbh43MgGSIZCRxl6gPUvK4EZZsCBoi>

**Nuevo en
curso
2018-19**

Modelos de cuestiones teorema de Gauss, capacidad y condensadores

https://drive.google.com/open?id=1NT3dUD4GWqDeHOUYFIH0PFz1z_qHC9fV

Matriz especificaciones Física 2º Bachillerato (BOE 23 diciembre 2016)

https://drive.google.com/open?id=1UBfv6V3NBvFT_lhaxTp5-DgDSCwUhm_x

Informe resultados Física cursos anteriores

AÑO	INFORME	ENLACE
2009-10	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1o7Q3z8qH8OZnZ9G7ghtb4ydD0pMmQm9u
2010-11	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1ADkbZerXYIGk9d-qP3I3-jQjOhBcs9H5
2011-12	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1BjYQI6WKYx6ud0BD_fiCW5msUFnjMaS4
2012-13	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1Gf9imp4Q8MgM8IVyKRKfaXQioSxq3aKx
2013-14	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1RmH-OG3XRXbyJymlhxLFQ-wtiVgA0Nhk
2014-15	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1OtqhwsPbkPPzavoCUD6kkZLMzegmv-8G
2015-16	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1mY1eQOWY6TRtfCRzs52rpD9Na6jl4ots
2016-17	EVAU	https://drive.google.com/open?id=1LQq14eDwOwXTd5B2_ICHVq2ZK59P7kXd
2017-18	EVAU	Informe de resultados en documento actual



ANEXO

Exámenes resueltos de Física resueltos años anteriores

AÑO (PAEG) 2010	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirSUFsax4RXhJTms
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirUIpkc2ZkNVVnZXc
AÑO (PAEG) 2011	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirMkNfM3phT2FhMHc
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirUnRMUUEwd0J4U3M
AÑO (PAEG) 2012	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirR3lQUWFGMTNOb1E
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirMWY4Ty1rOGxCNjg
AÑO (PAEG) 2013	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirOUhReFlyNkhveGs
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirU25ma3k0YzN1MGM
AÑO (PAEG) 2014	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirYllOSFd4VG5pVGc
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirWWxJMmM2ZUpadk0
AÑO (PAEG) 2015	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirQkN1XzVRNWVaTm8
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirQVA2cHF1ekVYeUE
AÑO (PAEG) 2016	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirZE40cTBxQlNpTEk
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=1zj8kpWBBqkhhWhmBuKE0ZIQ0-tXNoLxJ
AÑO (EVAU) 2017	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=0BxlvRARYcgirdVBnMzBOLWJ2X2c
	SEPTIEMBRE	https://drive.google.com/open?id=18rYO5rZ9Xzh-HDH5GyfKl9cQzTeQZHfI
AÑO (EVAU) 2018	EXAMEN	ENLACE
	JUNIO	https://drive.google.com/open?id=1P7_6uUOZ0PyY0_U1gsxZgSUR7bqP61yO
	JULIO	https://drive.google.com/open?id=1L6tfcUOTmZp_0_Zi91nIUo2isCHXGcd6



ANEXO

Enunciados adicionales de Física años anteriores

AÑO	ENUNCIADOS	ENLACE
2012-13	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1sH4suNqr7unqiP7jxqzj6Kf7x4WMfLrI
2013-14	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1X56qVR3_jMMg8BvZYckcBRw8w5oBsR0m
2014-15	PAEG	https://drive.google.com/open?id=164-PsgRni8InVSZTqxneW8cMpJYqPaLK
2015-16	PAEG	https://drive.google.com/open?id=1Comu5epSKh5sWSV48qjEkEkV-ghZg1Ug
2016-17	EVAU	https://drive.google.com/open?id=1uTYNRcJkmgg2O77YFs1x-ziZ6cdmPSGP
2017-18	EVAU	https://drive.google.com/open?id=1j4vqFHouU-xqOWNJ86isEzQPahCablCO

UCLM MODELOS EXAMEN PROPUESTOS DESDE 2007-2008 (todas las asignaturas)

<https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/modelospropuestos>

Nota: si en alguno de los enlaces de las páginas anteriores alguien advierte algún problema, se ruega comunicarlo por email a antonio.barbero@uclm.es.